

## لیست بیماریهای واگیر و سندروم‌های تحت مراقبت

در صورت مشاهده هریک از بیماریهای واگیر و یا سندروم‌های تحت مراقبت به واحد بهداشتی تعیین شده (مرکز بهداشت شهرستان/کارشناس کنترل عفونت) گزارش گردد.

\*\*\*\*\*

### الف: لیست بیماریهای عمدۀ تحت مراقبت کشور

(این لیست بنا به مورد و بطور سالیانه به روز رسانی خواهد شد):

#### گزارش آنی و بلافضله(کمتر از ۶ ساعت):

هاری - آنفلوانزای پرنده‌گان - تولارمی-طاعون - وبا - سیاه زخم تنفسی - بوتولیسم - زیکا - چیکونگونیا - ایبولا - تب های خونریزی دهنده - کرونا - تیفوئید مقاوم به درمان - هرگونه افزایش ناگهانی موارد بیماریها(طغیان یا اپیدمی)

#### گزارش فوری (در کمتر از ۲۴ ساعت):

فلج شل حاد- تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولر - سل ریوی - سیاه سرفه - دیفتری - کراز - سندروم سرخچه مادرزادی - منژیت - بستری در بیمارستان بدنیال و اکسیناسیون - ملااریا-اسهال خونی - تب دانگی - تب راجعه - تب زرد - جذام - سیاه زخم جلدی - کراز بالغین - شیستوزومیازیز

#### گزارش هفتگی(عمومی):

سایر انواع سل - انواع هپاتیت های ویروسی - تیفوئید - بروسلوز - کلاآزار جلدی و احشایی - شیگلوزیس - سفلیس - سوزاک - HIV/AIDS - کیست هیداتیک - توکسoplasmozیس - فاسیولیازیس - پدیکلوزیس - پتوسپیروزیس و گال - هپاتیت

A نوع

\*\*\*\*\*

### ب- لیست سندرم‌های واگیر تحت مراقبت

#### ۱- سندرم فلچ شل حاد (مهم ترین تشخیص افتراقی: فلچ اطفال-گیلن باره-

انواع مسمومیت-گرش حیوانات و حشرات سمی-عوارض واکسیناسیون) :

تعريف : فلچ شل ناگهانی یعنی عدم حرکت پا و یا دست بدون سابقه ترومای (ضربه) واضح جسمانی

#### ۲- سندرم تب و خونریزی(بدون تروما): (مهم ترین تشخیص های افتراقی

-CCHF-مننگوکسی-تیفوئید-دانگ-تب زرد- ایبولا - چیکونگونیا -

سرخک-مالاریای شدید-لپتوسپیروز- سپتی سمی):

تعريف : تب بیش از ۳۸ درجه دهانی به همراه یک یا چند علامت زیر)

خونریزی ناشی از تروما نباشد):

۱. خونریزی پوست به صورت کبودی (اکیموز)

۲. خونریزی نقطه نقطه (پتشی) در پوست

۳. خونریزی دستگاه تنفس فوقانی (خونریزی از لثه یا بینی)

۴. خونریزی دستگاه تنفس تحتانی (خلط خونی)

۵. خونریزی دستگاه گوارش (استفراغ خونی ، مدفوع خونی ، مدفوع سیاه)

#### ۶. خونریزی دستگاه ادراری (ادرار خونی )

۷. خونریزی دستگاه تناسلی (خونریزی غیرطبیعی زنانه )

#### ۸- سندرم تب و راش (بثورات) حاد :

الف : تب و راش حاد ماکولوپاپولر(مهم ترین تشخیص های افتراقی: مننگوکسی-سرخک-سرخچه-منونوکلئوز عفونی-CCHF-چیکون گونیا- دانگ- سفلیس-تیفوس-تیفوئید-راش دارویی-گرش حشرات):

تعريف : تب بیش از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علایم زیر به صورت منتشر:

۱. لکه های کوچک و همسطح غیر همنگ با پوست (ماکول) معمولاً به صورت منتشر
۲. دانه های کوچک و برجسته غیر همنگ با پوست (پابول) معمولاً به صورت منتشر
۳. حال عمومی بد

ب - تب و راش حاد غیر ماکولوپاپولر: (مهم ترین تشخیص های افتراقی: آبله-آبله مرغان-سیاه زخم-تولارمی-لیشمانيوز-گال):

تعريف : تب بالاتر از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علایم زیر:

۱. دانه های کوچک، برجسته و آبدار در پوست (زویکول)
۲. برجستگی های بزرگ پوستی حاوی مایع غیر چرکی (تاول) یا مایع چرکی (پوستول)
۳. بثورات فاقد پوست (زمهمهای بدون ضربه یا بریدگی)
۴. حال عمومی بد

#### ۹- سندرم شبه آنفلوانزا (مهم ترین تشخیص های افتراقی: آنفلوانزا-پاراآنفلوانزا-

سیاه سرفه-کرونا ویروس-سارس)

تعريف : تب به همراه سرفه ای که در طی یک هفته اخیر رخ داده باشد.

#### ۱۰- سندرم عفونت شدید حاد تنفسی ( مهم ترین تشخیص های افتراقی:

آنفلوانزا-کرونا - سل-سیاه سرفه-دیفتری-سرخک-سیاه زخم-تولارمی-طاعون):

تعريف: بروز تب و سرفه در طول یک هفته اخیر به همراه حداقل یکی از علایم زیر:

۱. سیستم تنفسی (تکی پنه "تنفس تند" ، فرورفتگی عضلات بین دندنه ای در حین تنفس ، تنفس صدادار ، خلط خونی)
۲. سیستم قلبی عروقی (درد قفسه سینه ، افت شدید فشار خون ، اختلال ریتم)
۳. سیستم عصبی (کاهش سطح هوشیاری ، تشنج)

#### ۱۱- سندرم سرفه مزمن (مهم ترین تشخیص افتراقی: سل)

تعريف: سرفه پایدار به مدت دوهفته یا بیشتر که معمولاً همراه با خلط می باشد.

#### ۱۲- سندرم مسمومیت غذایی: (مهم ترین تشخیص های افتراقی: مسمومیت با

عوامل شیمیایی-مسمومیت با عوامل باکتریایی، ویروسی، قارچی، انگلی- مسمومیت با فلزات سنگین-مسمومیت با سموم-تب مالت-مسمومیت با الکل):

تعريف: بروز علایم زیر در ۲ نفر یا بیشتر که از یک منبع غذایی یا آشامیدنی مشترک استفاده کرده اند و علایم بالینی مشابه دارند شامل:

۱. تهوع و استفراغ بعد از مصرف مواد غذایی یا آشامیدنی یا

۲. شکم درد (دل پیچه) بعد از مصرف مواد غذایی یا آشامیدنی

- ۸- **سندروم اسهال حاد غیرخونی** (مهم ترین تشخیص های افتراقی: اسهالهای ناشی از عوامل میکروبی، ویروسی، پارازیتی- وبا- تب مالت- عوامل شیمیایی):

تعريف: اسهال حاد (غیر خونی) یعنی دفع حداقل ۳ بار مدفع شل در

۲۴ ساعت بعلاوه: تهوع و استفراغ یا / شکم درد (دل پیچه)

- ۹- **سندروم اسهال خونی** (مهم ترین تشخیص های افتراقی: شیگلا-آمیبیاز- سالمونلا-فلزات سنگین-سیاه زخم- انواع دیگر وبا):

تعريف: اسهال خونی (وجود خون روشن در مدفع اسهالی) با یا بدون:

تهوع و استفراغ یا / شکم درد (دل پیچه)

- ۱۰- **سندروم زردی حاد** (مهم ترین تشخیص های افتراقی: انواع هپاتیت-مالاریای شدید- لپتوسپیروز- بورلیوز- تب زرد- فاسیولاریس- مسمومیت های شیمیایی- مسمومیت های قارچی):

تعريف: "زردی در سفیدی چشم" یا / زردی زیر زبان یا / زردی خط وسط شکم

- ۱۱- **سندروم تب و علایم نورولوژیک (عصبی)** (مهم ترین تشخیص های افتراقی: انواع منزئت- انواع آنسفالیت- آنفلوانزا- آبله مرغان- هاری- مalarیای زخم- طاعون- مسمومیت "با سرب، جیوه، ارگانوفسفره، حلال های صنعتی" ):

تعريف: بروز تب ناگهانی بالای ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علایم زیر:

سفتی گردن (سختی حرکات گردن) / اتشنج / کاهش هوشیاری / تحریک پذیری / سردرد شدید / استفراغ

- ۱۲- **سندروم شوک عفونی** (مهم ترین تشخیص های افتراقی: مننگوکوکسی- تیفوئید- بروسلوز- طاعون- آنفلوانزا- کورونا ویروس- سارس- مalarیا- وبای خشک- تب های خونریزی دهنده- سیاه زخم):

۱۲/۱. تعريف: بیمار بدحال با شواهد یک عفونت موضعی یا سیستمیک (به عنوان مثال رویت ترشح چرکی) یا احتمال (استعداد) عفونت مثل نقص اینمنی، سوختگی، ... بعلاوه حداقل دو علامت از ۳ علامت حیاتی ذیل:

۱. تاکی پنه (تنفس تندرتر از حد نرمال)

۲. تاکی کاردی (ضریبان قلب بیشتر از حد نرمال)

۳. داشتن درجه حرارت کمتر از ۳۶ درجه سانتی گراد (هایپوترمی) یا داشتن تب بالای ۳۸ درجه سانتی گراد

۱۲/۲. علایم کمکی:

۱. اختلال عملکرد ارگانهای دور از محل عفونت (بدلیل هیپوپرفیوژن و بروز ایسکمی)

۲. افت فشار خون که با تجویز مقدار کافی مایعات مناسب مثل نرمال سالین، رینگر لاكتات قابل برگشت باشد.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت - مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

اداره مراقبت - آذر ۱۳۹۹